

СПРАВКА

о радиационной обстановке на территории Калужской области в 2024 году

Каткова М.Н., Полянская О.Н., Яхрюшин В.Н., Зубачева А.А.

Радиационную обстановку в Калужской области определяют вторичный ветровой перенос глобальных радиоактивных выпадений, обусловленных проведенными ранее ядерными взрывами, а также радиоактивных выпадений, обусловленных чернобыльской аварией. Дополнительно на локальном уровне прослеживается влияние радиационно-опасных объектов (РОО).

Радиационно-опасными объектами на территории Калужской области, эксплуатирующими ядерные реакторы и имеющими радиохимические лаборатории на территории области, являются ФГУП «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (далее – ФЭИ) и филиал ФГУП «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова» (далее – филиал НИФХИ), расположенные на территории г. Обнинска [1]. РОО г. Обнинска в процессе производственной деятельности осуществляют газо-аэрозольные выбросы в атмосферу, содержащие техногенные радионуклиды.

Кроме этого, в области имеются территории, загрязненные вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в 1986 году, расположенные в Жиздринском, Людиновском, Ульяновском, Хвастовичском, Думиничском, Кировском, Козельском, Куйбышевском и Мещовском районах. Большинство загрязненных населенных пунктов в области было впервые обследовано только в 1991-1993 годах. По состоянию на 01.01.1994 в загрязненных районах было 368 населенных пунктов с уровнем загрязнения ^{137}Cs больше 1 Ки/км^2 , к 2025 году их осталось 163. Уменьшение числа загрязненных населенных пунктов произошло, в основном, за счет радиоактивного распада, смыва и миграции ^{137}Cs вглубь почвы. Таким образом, количество населенных пунктов Калужской области, расположенных на загрязненных территориях на 01.01.2025 г. было следующим [2]:

- с плотностью загрязнения почвы ^{137}Cs от 1 до 5 Ки/км^2 – 161;
- с плотностью загрязнения почвы ^{137}Cs от 5 до 15 Ки/км^2 – 2.

Радиационный мониторинг на территории Калужской области проводится Росгидрометом на стационарных постах наблюдения и с помощью маршрутных обследований путем отбора проб компонентов природной среды с их последующим анализом.

На стационарных постах проводятся наблюдения (рис. 1):

- за объемной активностью радионуклидов в приземном слое атмосферы путем радиоизотопного анализа проб аэрозолей, отобранных с помощью воздухо-

фильтрующей установки (ВФУ) производительностью 1100 м³/ч, расположенной на территории высотной метеорологической мачты (ВММ). Пробы воздуха отбираются на два фильтра ФПП-15-1,5 (для улавливания аэрозолей) и СФМ-И (для улавливания радиоактивного йода в молекулярной форме) с экспозицией одни сутки;

– за радиоактивностью атмосферных выпадений путем радиоизотопного анализа проб, отобранных с суточной экспозицией с помощью горизонтальных марлевых планшетов без бортиков площадью 0,3 м², установленных в пяти пунктах (Жиздра, Калуга, Малоярославец, Обнинск, Спас-Деменск);

– за мощностью амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) в семи пунктах (Жиздра, Калуга, Малоярославец, Мосальск, Обнинск, Спас-Деменск, Сухиничи) с помощью дозиметров ДРГ-01Т1, ДБГ-06Т, ДКГ-09Д.



Рис. 1. Стационарные посты наблюдения СРМ Росгидромета на территории Калужской обл.:

- – наблюдения за γ -фоном;
- ▲ – отбор проб атмосферных выпадений;
- – наблюдения за атмосферными аэрозолями (ВФУ).

Отбор проб атмосферных выпадений и измерения МАЭД в пунктах Жиздра, Калуга, Малоярославец, Мосальск, Спас-Деменск, Сухиничи проводит ФГБУ «Калужский центр по гидрологии и мониторингу окружающей среды» (Калужский ЦГМС), являющимся филиалом ФГБУ «Центральное межрегиональное территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Центральное УГМС), в г. Обнинске – Институтом проблем мониторинга окружающей среды (ИПМ) ФГБУ «НПО «Тайфун».

Суммарная бета-активность ($\Sigma\beta$) суточных проб атмосферных аэрозолей и выпадений, отобранных в г. Обнинске, анализируется в аккредитованной лаборатории ИПМ, а проб выпадений, отобранных в пунктах Жиздра, Калуга, Малоярославец, Спас-Деменск, – в радиометрической лаборатории Калужского ЦГМС.

Гамма-спектрометрический анализ проб атмосферных аэрозолей и выпадений, отобранных на территории Калужской области, проводится в лаборатории ИПМ. Объединенные за месяц пробы, отобранные в г. Обнинске (наличие РОО), измеряются ежемесячно, объединенные пробы выпадений в п. Жиздра (загрязненная в результате аварии на ЧАЭС территория) и по трем пунктам Калужской области (Калуга, Малоярославец, Спас-Деменск) измеряются ежеквартально.

Радиохимический анализ (содержание ^{90}Sr), объединенных за полугодие проб атмосферных аэрозолей, отобранных в г. Обнинске, проводится лабораторией ИПМ.

По данным Калужского ЦГМС за 2024 г., среднемесячные и среднегодовые значения МАЭД на территории области не выходили за пределы колебаний глобального гамма-фона и изменялись от 0,09 до 0,14 мкЗв/ч и от 0,10 до 0,12 мкЗв/ч, соответственно. Максимальные среднесуточные значения МАЭД изменялись в пределах от 0,13 до 0,20 мкЗв/ч. Максимум наблюдался в августе в Калуге.

Таблица 1

Среднемесячные (с) и максимальные суточные (м) значения выпадений (Р) и объемной $\Sigma\beta$ (q) в воздухе на территории Калужской области.

Пункты наблюдения		Месяцы												2024 г.	2023 г.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Р, Бк/м ² ·сутки												Сумма, Бк/м ² ·год	
Калуга	с	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,5	0,7	1,3	0,7	0,6	256	255
	м	0,8	1,4	2,0	2,2	1,6	2,4	2,0	1,0	1,9	2,9	2,6	1,9		
Малояросла- вец	с	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,9	0,7	0,4	0,5	0,7	0,5	0,5	220	219
	м	0,8	1,5	1,4	1,8	1,3	2,4	2,0	1,2	1,2	1,5	2,7	1,2		
Обнинск	с	0,5	0,7	0,4	0,6	0,5	0,8	0,9	0,9	1,3	0,8	0,8	0,7	256	301
	м	1,9	4,9	1,3	1,7	1,6	2,3	3,0	5,0	6,0	2,6	3,1	2,3		
Жиздра	с	0,4	0,7	0,5	0,6	0,6	0,8	0,7	0,7	0,5	1,0	0,5	0,6	220	219
	м	0,8	2,0	2,0	2,0	1,8	2,4	2,3	2,3	1,6	3,0	2,4	1,9		
Спас-Деменск	с	0,4	0,7	0,6	0,8	0,6	0,8	0,6	0,3	0,6	1,1	0,7	0,6	256	256
	м	0,7	2,3	1,5	2,3	2,3	2,4	1,6	1,4	1,6	2,8	1,6	1,3		
		q, 10 ⁻⁵ Бк/м ³												Среднее	
Обнинск	с	19	28	23	18	20	22	25	23	40	27	17	14	23	26
	м	30	79	54	58	42	38	54	48	76	66	39	32		

Примечание: – нет данных.

Суммарная бета-активность ($\Sigma\beta$) радиоактивных выпадений в 2024 г. на территории области не выходила за пределы фоновых колебаний (см. табл. 1) [3].

В атмосферных выпадениях из техногенных радионуклидов регистрировался только ^{137}Cs . Фоновые выпадения ^{137}Cs по Калужской области, полученные в результате анализа

проб, объединенных по трем пунктам (Калуга, Малоярославец и Спас-Деменск), расположенным на не загрязненной территории, в 2024 г. увеличились в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом и составили 0,39 Бк/м²·год (см. табл. 2 [3]), что в 2 раза выше средневзвешенного годового значения выпадений ¹³⁷Cs для не загрязненного в результате Чернобыльской аварии Центра территории России в 2023 г. (0,18 Бк/м²·год) [3].

В Обнинске годовые выпадения ¹³⁷Cs в 2024 г. были на уровне 2022 г. В Жиздре, расположенной на загрязненной после Чернобыльской аварии территории, выпадения ¹³⁷Cs в 2024 г. увеличились в 1,4 раза по сравнению с 2023 г. и были в 4,6 раза выше фоновых выпадений по Калужской области.

Таблица 2

Атмосферные выпадения ¹³⁷Cs на территории Калужской области

Месяц	Обнинск, Бк/м ² ·месяц			Региональный фон ¹ , Бк/м ² ·квартал			Жиздра, Бк/м ² ·месяц		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Январь	0,083	0,035	0,028	0,09	0,042	< 0,04	0,1	< 0,1	< 0,1
Февраль	нпо	нпо	нпо						
Март	нпо	нпо	нпо						
Апрель	нпо	нпо	нпо	0,15	0,087	0,15	0,51	0,34	0,32
Май	нпо	нпо	нпо						
Июнь	нпо	нпо	нпо						
Июль	нпо	нпо	нпо	0,11	0,13	0,12	0,90	0,51	0,37
Август	нпо	нпо	нпо						
Сентябрь	нпо	0,15	нпо						
Октябрь	нпо	0,055	0,063	0,043	< 0,03	< 0,03	0,31	0,32	0,042
Ноябрь	0,07	0,52	нпо						
Декабрь	нпо	нпо	нпо						
Сумма за год, Бк/м ² ·год	< 1,1	1,6	< 1,1	0,39	0,29	0,34	1,8	1,3	0,83

¹ – среднее по трем пунктам: Калуга, Спас-Деменск, Малоярославец, нпо- ниже предела обнаружения, < 0,1 Бк/м².

Выпадения природного радионуклида ⁷Be в Обнинске в 2024 г. изменялись в диапазоне 16 –118 Бк/м²·месяц, составив за год 570 Бк/м². Годовые выпадения природного ⁴⁰K составили 53 Бк/м², изменяясь от 1 до 12 Бк/м²·месяц.

Среднегодовая объемная суммарная бета-активность радионуклидов в воздухе Обнинска (см. табл. 1) в 2024 г. составила 23·10⁻⁵ Бк/м³ и была на уровне 2023 г. и на уровне средневзвешенной объемной Σβ по территории Центра ЕТР в 2023 г. (25 ·10⁻⁵ Бк/м³).

Из техногенных радионуклидов в приземном слое атмосферы Обнинска в 2024 г., как и в предыдущие годы, регулярно регистрировались ¹³⁷Cs, ⁹⁰Sr и ¹³¹I (см. табл. 3 [3]).

Таблица 3

**Среднемесячная объемная активность радионуклидов в воздухе г. Обнинска, Бк/м³
(данные НПО «Тайфун»)**

Месяц	¹³⁷ Cs, 10 ⁻⁷		⁹⁰ Sr, 10 ⁻⁷		¹³¹ I, 10 ⁻⁵		⁷ Be, 10 ⁻⁵	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Январь	3,3	4,6	0,47	0,30	3,1	15	81	248
Февраль	1,1	2,2			4,9	12	193	131
Март	3,1	3,4			15	16	203	190
Апрель	5,4	1,9			11	30	184	286
Май	1,5	1,6			6,1	4,2	266	216
Июнь	1,7	2,4	-	0,82	5,8	4,1	254	326
Июль	2,7	2,0			26	2,9	287	274
Август	3,8	3,1			3,8	11	269	254
Сентябрь	6,8	5,8			17	4,6	357	417
Октябрь	2,8	6,9			6,9	3,9	136	127
Ноябрь	4,4	6,1			29	5,3	103	131
Декабрь	2,3	4,3			9,1	7,6	77	155
Среднее	3,2	3,7	-	0,55	11	9,7	201	230

Примечание: - – нет данных; нпо – ниже предела обнаружения.

Из таблицы видно, что среднегодовая объемная активность ¹³⁷Cs в Обнинске в 2023 г. составляла $3,2 \cdot 10^{-7}$ Бк/м³, что в 1,3 раза выше уровня средневзвешенного значения для Центра ЕТР за 2023 г. ($2,5 \cdot 10^{-7}$). Содержание ⁹⁰Sr в воздухе в первом полугодии 2023 г. (см. табл. 3) было на уровне средневзвешенного значения Центра ЕТР за 2023 г. ($0,4 \cdot 10^{-7}$ Бк/м³). Среднегодовые объемные активности ¹³⁷Cs и ⁹⁰Sr были на семь порядков ниже допустимой среднегодовой объемной активности (ДОНАС.) этих радионуклидов в соответствии с НРБ-99/2009 [4].

В 2024 г. в приземном слое атмосферы в центре Обнинска было зарегистрировано 106 случаев появления ¹³¹I (в 2023 г. – 107, в 2022 г. – 108, в 2021 г. – 109). Среднегодовая объемная активность ¹³¹I в воздухе Обнинска в 2024 г. осталась на уровне 2023 г. и составила $11 \cdot 10^{-5}$ Бк/м³ (см. табл. 3), что на пять порядков ниже допустимой среднегодовой активности для ¹³¹I. Максимальная объемная активность ¹³¹I наблюдалась 02-03.07.2024 и составляла $4,5 \cdot 10^{-3}$ Бк/м³, что на три порядка ниже допустимой среднегодовой активности для ¹³¹I (ДОНАС. = $7,3 \cdot 10^{-3}$ Бк/м³ в соответствии с НРБ-99/2009).

Из естественных радионуклидов в приземном слое атмосферы Обнинска определялись ⁷Be и ⁴⁰K. Среднегодовая объемная активность ⁷Be в воздухе от года к году меняется в пределах одного порядка величины и в 2024 г. составляла $201 \cdot 10^{-5}$ Бк/м³ (см. табл. 3). Объемная активность ⁴⁰K в 2024 г. изменялась в диапазоне $(0,1-1,7) \cdot 10^{-5}$ Бк/м³ со среднегодовым значением $0,8 \cdot 10^{-5}$ Бк/м³.

В целом, в 2024 г. радиационная обстановка на территории Калужской области была стабильной. Наблюдавшиеся в 2024 г. уровни радиоактивного загрязнения окружающей

среды техногенными радионуклидами в ближней 10-км зоне РОО Обнинска были значительно ниже существующих нормативов. Однако местные РОО оказывают влияние на загрязнение атмосферы Обнинска ^{131}I , отсутствующим в составе глобального радиоактивного фона.

Список литературы

1. Распоряжение Правительства РФ от 14.09.2009 №1311-р с изменениями на 24 июня 2022 года «Об утверждении перечня организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно-опасные производства и объекты» [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/902175518>
2. Данные по радиоактивному загрязнению территории населенных пунктов Российской Федерации цезием-137, стронцием-90 и плутонием-239,240. – Обнинск: ФГБУ «НПО «Тайфун», 2024. – 224 с.
3. Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств в 2023 году. Ежегодник. – Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2024. – 334 с.
4. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009): Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.6.1.2523-09. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. – 100 с.